

POŠKODBA GLAVE (vključno s postopkom snemanja motoristične čelade – kdaj in kako)

POŠKODBE GLAVE

Vrste: poškodbe mehkih delov glave, poškodbe skeleta lobanje brez prizadetosti možganskega tkiva ter najhujše poškodbe glave, pri katerih je hkrati prizadeto tudi možgansko tkivo.

PP: rane mehkih delov na glavi običajno močno krvavijo, ker je področje glave dobro prekrvljeno. Rane sterilno obvežemo. Rane na obrazu, ki močno krvavijo, obvežemo z običajno kompresijsko obvezo in s tem ustavimo krvavitev. Drugje na glavi pa pri močni krvavitvi zaustavimo tako, da napravimo kompresijsko obvezo s svitkom: iz trikotnih rut naredimo svitek, ga položimo okoli rane – ne na rano! – in s povojem čvrsto povijemo ter s tem pritismo na okolico rane, tako da ustavimo krvavitev. S pomočjo svitka obvezujemo tudi večje rane na glavi z odprtimi prelomi lobanjskih kosti. Kadar se v rani vidi tudi možgansko tkivo, je ne čistimo. Narahlo pokrijemo s sterilno gazo, s trikotno ruto napravimo dovolj velik svitek, ga položimo okoli rane in s povojem obvežemo. Svitek pri tem preprečuje, da bo obveza pritiskala na možgansko tkivo, ki sili iz rane. Počakamo na reševalce.

ČELADO snamemo, kadar je potrebno oživljanje, ali pa če začne poškodovanec z čelado na glavi bruhati in bi se drugače lahko zadušil.

Za optimalno izvedbo tega postopka sta potrebna dva usklajena pomagača.

Oseba, ki je za poškodovančevo glavo fiksira glavo s prijemom preko čelade, kleči za njim ali leži, tako da ima svoje komolce naslonjene na podlago ali na svoje noge v primeru če kleči.

Oseba, ki pa je na eni ali drugi strani poškodovanca, pa si ogleda čelado (lahko je preklopna ali pa v enem kosu z bradnim delom).

Tudi preklopna čelada mora z glave, sprostiti dihalne poti, lahko je samo to vzrok odsotnosti **Dih.** oz. nenormalnega **Dih.**

Sprostiti dihalno pot, mu vzvrnemo glavo navzad in dvignjeno spodnjo čeljust, s tem manevrom je dih. pot sproščena, in poškodovanec lahko zadiha - držimo v tem položaju do prihoda reševalcev.

Postopek snemanja čelade:



- pogledamo podbradni pas (če ga znamo odpeti, če ne ga prerežemo, ne poškodujemo poškodovančevega vratu, s prsti ene roke gremo pod pašček in nad svojimi prsti prerežemo)
- varovanje vratnega dela hrbtenice
- z roko katera je bližja osebi, ki je za poškodovančevo glavo gremo pod vrat poškodovanega motorista in ga krepko zagrabimo, komolec imamo na tleh, uprti ob podlago
- z drugo roko primemo za poškodovančeve čeljustne kote, spodnja čeljust - sklep na spodnji čeljusti - vilice in z

obema rokama krepko držimo



- oseba, ki je držala glavo poškodovanca preko čelade spusti in prime čelado pod odpet podbradni pas na vsaki strani, čelado razširi, prične z izvlačenjem čelade, počasi jo vleče z poškodovančeve glave
- skozi odprt vezir gleda kdaj bo čelada preko nosu, jo zvrne z glave - tako kot si jo nadenemo na glavo tako mora z glave
- (če bi jo začel zvrčati še preden bi bila čelada preko nosu se ob tem bradni del zatakne za nos in ga lahko dodatno poškoduje)



- pomagalec, ki skrbi v postopku izvlačenja čelade z glave, s spodnjo roko sledi zatilnemu delu čelade in drsi po glavi proti temenu, preprečuje, nekontroliran padeč glave z višine (kolikor je debela čelada na podlago),
- iz zatilja se pomika proti temenu glave.



Ko odstranimo čelado ponovno preverimo dihanje, ker smo šele sedaj kvalitetno sprostili dih. pot, ali je mogoče poškodovani zadihal. Če poškodovani še vedno ne diha moramo nemudoma začeti z oživljanjem.

